

Tre tips om du tar Levaxin!

Om du har problem med din sköldkörtel och tar Levaxin är det viktigt att tänka på:



Ta Levaxin med enbart vatten, helst på morgonen, 30 minuter före frukost.



Se till att du får uppföljning med blodprover och läkarbesök minst varje till vartannat år.



Berätta för din läkare om du har kvar, eller får nya, symtom som skulle kunna ha med sköldkörteln att göra. Det kan vara tecken på att din behandling behöver justeras.

Läs mer om olika sköldkörtelsjukdomar, symtom och behandlingar på vår webbplats: **skoldkortelforbundet.se**



En halv miljon svenskar behandlas för underfunktion i sköldkörteln, hypotyreoos.

Sköldkörtelförbundet är en samlad röst för dig som lever med sköldkörtelsjukdom eller är närstående. Vi ger dig kunskap, stöd och gemenskap. Ju fler medlemmar vi är - desto starkare blir vår röst!



Det handlar om att få ett fullvärdigt liv

"Jag blev medlem för att förbundet började driva frågan om individanpassad vård. Man läser om så många som inte får hjälp för att läkare verkar gå efter någon mall och stirra sig blinda på provresultatet. Jag vill att läkare ska se till personens faktiska mående, för det handlar om att få ett fullvärdigt liv."

/Ulrika, 56 år, medlem sedan 2019

Bli medlem du också!

Se vad ett medlemskap kan ge dig och vad ditt stöd bidrar till. Använd mobilens kamera för att läsa av QR-koden eller gå till skoldkortelforbundet.se/medlemssida

